

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l’Azienda
Ospedaliera Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara**

PROVA SCRITTA – PROVA 05

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

-
- 1 Nell'immediato postoperatorio, quali sono gli intervalli di tempo per la rilevazione della temperatura corporea, nelle prime 24 ore?
- A** Ogni 18 ore
 - B** Ogni 4 ore
 - C** Ogni 36 ore
 - D** Una volta nella settimana
-
- 2 Nell'esecuzione di un esame dell'area rettale e perianale, l'infermiere dovrà fare assumere alla persona la posizione:
- A** di semi-Fowler
 - B** genupettorale
 - C** supina
 - D** di anti-Trendelenburg
-
- 3 Quale tra le seguenti scale di misurazione del dolore valuta le risposte comportamentali e i parametri fisiologici?
- A** NRS: Numeric Rating Scale
 - B** VRS: Scala di Valutazione Verbale
 - C** PAINAD: Pain Assessment in Advanced Dementia
 - D** Wong-Baker Faces Pain Rating Scale
-
- 4 Uno degli scopi di una medicazione a piatto attuata su una ferita chirurgica semplice in via di normale guarigione è:
- A** ridurre il disagio dovuto alla visione della ferita
 - B** ritardare la cicatrizzazione
 - C** proteggere da parassiti
 - D** prevenire il sanguinamento
-
- 5 Chiunque riveli l'identità di chi ha fatto ricorso agli interventi previsti dalla legge per l'interruzione volontaria della gravidanza, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, è punito con una sanzione di carattere:
- A** amministrativo
 - B** civile
 - C** penale
 - D** pecuniario
-
- 6 Un assistito con dolore assume terapia con morfina. Per valutare l'eventuale comparsa di effetti collaterali, quali dati raccoglierà l'infermiere?
- A** Frequenza e caratteristiche dell'eliminazione fecale
 - B** Quantità e caratteristiche delle urine
 - C** PT, PTT e INR
 - D** Temperatura corporea interna ed esterna

Quale, tra le seguenti sostanze, è in grado di sterilizzare strumenti termosensibili o che contengono componenti elettronici?

- A** Ossido di etilene
 - B** Clorexidina
 - C** Soluzione alcolica al 40%
 - D** Soluzione alcolica al 90%
-

8 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da tubercolosi polmonare aperta, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?

- A** Non sono necessari dispositivi di protezione individuale in quanto per questa malattia non esiste la trasmissione interumana
 - B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare solo guanti e camice nei contatti con il malato
 - C** Dovranno adottare le precauzioni standard, indossare guanti, camice nei contatti con il malato e, se non immuni, un filtrante facciale a protezione 2 prima dell'ingresso nella stanza di degenza
 - D** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare un filtrante facciale a protezione 2 prima dell'ingresso nella stanza di degenza
-

9 A una persona diabetica cosciente in ipoglicemia è indicato somministrare:

- A** 15 g di carboidrati semplici
 - B** circa 50 g di carboidrati complessi, come fette biscottate, pane o cracker
 - C** una fetta di torta oppure 5-6 biscotti secchi
 - D** 5 g di glucosio in compresse
-

10 Il Codice Deontologico dell'Infermiere, pubblicato nel 2019, all'art. 1 definisce l'infermiere come:

- A** l'operatore sanitario responsabile dell'assistenza sanitaria
 - B** il professionista sanitario, iscritto all'ordine delle professioni infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile
 - C** il professionista sanitario responsabile dell'assistenza socio-sanitaria
 - D** il professionista sanitario in possesso del diploma in Scienze infermieristiche
-

11 Oltre a un aumento dei valori della pressione venosa centrale, è un segno clinico d'insufficienza cardiaca destra:

- A** la poliuria e conseguente polidipsia
 - B** la comparsa di polifagia
 - C** la comparsa di edemi declivi
 - D** la bradicardia
-

12 Le infezioni genitali da HPV nella donna hanno una rilevante importanza clinica perché:

- A** sono molto comuni
 - B** possono degenerare in cancro, se sostenute soprattutto da alcuni genotipi
 - C** si associano quasi sempre a infezione batterica
 - D** sono molto dolorose
-

-
- 13 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta corretto applicare nel caso in cui sia necessario somministrare farmaci?
- A** Polverizzare le compresse a rilascio prolungato o gastroprotette e somministrarle attraverso la sonda, lavandone accuratamente il lume con 30-50 ml di acqua per evitarne l'occlusione
 - B** Polverizzare le compresse singolarmente e somministrarle una per volta, sciolte in acqua, senza mischiarle alla formula alimentare, lavando successivamente il lume della sonda con 30-50 ml di acqua
 - C** Polverizzare le compresse e somministrarle in un'unica manovra, sciolte insieme in acqua, senza mischiarle alla formula alimentare, lavando successivamente il lume della sonda con 30-50 ml di acqua
 - D** Polverizzare le compresse e scioglierle in acqua, somministrandole insieme alla formula alimentare, lavando successivamente il lume della sonda con 30-50 ml di acqua
-
- 14 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale intermittente, quali interventi infermieristici dovranno essere eseguiti per prevenire la diarrea?
- A** Somministrare lentamente una dieta a temperatura ambiente
 - B** Somministrare la dieta posizionando l'assistito in decubito supino
 - C** Aumentare l'apporto idrico e sostituire il preparato per nutrizione con una dieta a osmolarità maggiore
 - D** Somministrare una dieta iperosmolare a basso flusso, a basso contenuto idrico e a temperatura ambiente
-
- 15 Rispetto alle tecniche di esame fisico diretto, l'auscultazione:
- A** è utilizzata per determinare la struttura, la sede, le dimensioni, la consistenza, le masse e i liquidi nei vari distretti corporei
 - B** comporta l'uso delle dita e delle mani per percuotere un'area al fine di produrre un suono ed evidenziare se le strutture sono solide oppure piene di aria o liquidi
 - C** è la rilevazione con l'udito dei suoni legati al movimento del corpo, tramite l'uso di un fonendoscopio
 - D** è l'inizio naturale dell'esame fisico ed è utilizzata per rilevare specifiche caratteristiche fisiche o comportamenti
-
- 16 Si definisce "ipossia":
- A** una condizione in cui prevale un metabolismo aerobico
 - B** una pressione di CO₂ al di sotto dei 60 mmHg
 - C** una pressione di O₂ al di sotto dei 60 cmH₂O
 - D** una pressione di O₂ al di sotto dei 60 mmHg
-
- 17 Al fine di prevenire lo sviluppo di lesioni da pressione nei soggetti a rischio è importante:
- A** ridurre al minimo frizione e attrito sulla superficie d'appoggio della cute
 - B** effettuare le mobilizzazioni trascinando il paziente sulle lenzuola
 - C** ridurre la frequenza dell'igiene perineale in caso di incontinenza fecale
 - D** evitare le variazioni di decubito nel letto
-
- 18 Qual è il più importante veicolo di infezione ospedaliera?
- A** I degenti
 - B** Le mani dell'operatore
 - C** Le lenzuola e gli effetti personali del paziente
 - D** La strumentazione sanitaria
-

-
- Con riferimento ai cateteri vescicali, quale delle seguenti alternative è ERRATA?
- A** La scala di misurazione è quella di French
 - B** Maggiore è il diametro del lume, maggiore è il numero del catetere
 - C** Maggiore è il diametro del lume, minore è il numero del catetere
 - D** I numeri della scala di misurazione corrispondono al diametro del lume
-
- 20 Indicare l'alternativa che riporta tutte e solo le sedi utilizzate per l'iniezione intramuscolare.
- A** Dorsoglutea, ventroglutea, deltoidea, vasto laterale, retto laterale
 - B** Dorsoglutea, lateroglutea, deltoidea, vasto femorale, retto femorale
 - C** Dorsoglutea, ventroglutea, deltoidea, vasto laterale, retto femorale
 - D** Dorsoglutea, deltoidea, vasto laterale, retto femorale
-
- 21 Quale ente, secondo il d.lgs. 229/1999, provvede all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture pubbliche o private a fornire prestazioni per conto del SSN?
- A** La Regione
 - B** L'ASL o la Provincia/Città metropolitana
 - C** Il Ministero della Salute o il Consiglio dei Ministri
 - D** Il Comune o la zona di competenza
-
- 22 Qual è l'esame strumentale che valuta i volumi polmonari?
- A** Ossimetria
 - B** Capnometria
 - C** Spirometria
 - D** Videolaringoscopia
-
- 23 Quale delle seguenti attività NON rientra tra quelle attribuite alla professione infermieristica?
- A** La prevenzione
 - B** La diagnosi
 - C** L'educazione sanitaria
 - D** L'assistenza sanitaria
-
- 24 I tempi di digiuno preoperatorio, nell'adulto, per l'assunzione di un pasto leggero, prima di una procedura di chirurgia elettiva, sono pari a:
- A** 2 ore
 - B** 18 ore
 - C** 24 ore
 - D** 6 ore
-
- 25 Quale tra le seguenti NON è un'indicazione al posizionamento di catetere vescicale?
- A** Quando è necessario iniettare mezzi di contrasto in vescica a scopo diagnostico
 - B** Ritenzione urinaria o assenza di riflesso neurologico vescicale
 - C** Mantenere la vescica vuota in caso di interventi chirurgici a carico delle vie urinarie
 - D** Neoplasia del bacinetto renale o dell'uretere, per il quale sia stato posizionato uno stent

26 La trasmissione di *Salmonella typhi* avviene:

- A** per via sessuale
- B** per via oro-fecale
- C** per via aerea
- D** per contatto parenterale

27 Qual è la via di somministrazione delle EBPM (eparine a basso peso molecolare)?

- A** Intramuscolare
- B** Orale
- C** Sottocutanea
- D** Transdermica

28 I pazienti con lesioni del cavo orale e i pazienti che non possono assumere liquidi per bocca hanno bisogno di sciacquare la bocca:

- A** con della pasta all'acqua profumata al mentolo almeno ogni due ore
- B** una o due volte al giorno e detergere la rima labiale per evitare la formazione di secrezioni
- C** solo dopo il pasto più abbondante della giornata e idratare le labbra con vaselina
- D** almeno ogni due ore e idratare le labbra con prodotti emollienti

29 Una complicanza precoce della tracheostomia è:

- A** la fistola tracheo-esofagea
- B** l'enfisema sottocutaneo
- C** l'infezione respiratoria
- D** la stenosi tracheale

30 Nel caso di un paziente portatore di catetere vescicale a permanenza, occorre che la sacca di raccolta delle urine sia:

- A** posta sopra il livello della vescica
- B** posta sotto il livello della vescica
- C** scollegata dal catetere vescicale in caso di mobilizzazione del paziente
- D** collegata al catetere solo nelle ore diurne

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

31 Il trattamento che permette di regolare la composizione del sangue di pazienti affetti da gravi malattie renali è detto:

- A** nefrite
- B** nefrectomia
- C** ematoma
- D** emodialisi

52 Le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, sono definite dai:

- A** Livelli Europei di Assistenza
- B** Livelli Sanitari Garantiti
- C** Livelli Garantiti di Assistenza
- D** Livelli Essenziali di Assistenza

დოდანა უბრა